




# Grandes Cultures



MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA PÊCHE

## D.R.A.F. CENTRE

Service Régional de la  
Protection des Végétaux  
93, rue de Curambourg  
45404 Fleury les Aubrais  
Tél. 02.38.22.11.11  
Fax 02.38.84.19.79  
SRPV.DRAF-CENTRE@  
agriculture.gouv.fr

Imprimé à la Station  
d'Avertissements agrico-  
les de la Région CENTRE  
La Directrice-Gérante :  
M. HANRION  
Publication périodique  
C.P.A.P. n° 80530  
ISSN n° 0757-4029

Diffusion en collabora-  
tion avec la FREDEC  
CENTRE (Art L252-1 à  
L252-5 du Code Rural)

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

REGION CENTRE

www.srpv-centre.com

19 JUL 2002 \*000109

Bulletin technique n° 25 du 18/07/2002 - 2 pages

## Maïs

**Stade** : sortie des panicules ; soies visi-  
bles dans les parcelles très avancées

## Ravageurs

### Pyrale

**Poursuite du vol** : le nombre de captures  
continue à être élevé dans certains sites  
(voir tableaux page suivante).

**Pontes** : On remarque parfois quelques  
dégâts (feuilles perforées, sciure), mais  
dans la plupart des parcelles, les derniè-  
res observations montrent que le **dépôt**  
**de pontes** est :

- **nul** (Nazelles\*-37-, Sainte Solange, Avord-  
18-, Vatan-36-, Fresnes\*, Meslay\*, Pontle-  
voy\*, Rahart\*, Soings\*-41-, Ouzouer/Tré-  
zée-45-),

- **à modéré** (4% de plantes avec pontes à  
Brizay-37-, 3% à Avaray\* et Lestieu\*, 1%  
à Mulsans\*, 1% à Oucques\*, 3% à Ro-  
che\*, 1% à Navelle\* et St Ouen\*, 5% à  
Suèvres\*, 2% à Tripleville\*, 2% à Epui-  
say\*-41-, 5% à Beaugency\*-45-, 4% à  
Amilly et Courtemaux-45-);

- **élevé** dans quelques parcelles (Char-  
sonville-45-, 22% des pieds avec des pon-  
tes, 14% avec des pontes fraîches ; Ta-  
vers\*-45-, 8 pontes fraîches sur 20 pieds).

\* = **observations réalisées sur des par-  
celles en maïs doux ; sur cette culture,**  
**le niveau de tolérance est très infé-  
rieur à ce qui est accepté en maïs**  
**grain.**

### Pucerons

Les parcelles sont le plus souvent saines  
(Charnizay-37-, Vatan-36-, Crécly-Couvé-  
28, Ambloy-41-, Villamblain-45-...) mais  
on observe parfois des colonies ; plusieurs  
espèces sont présentes :

- des espèces non nuisibles aux stades  
actuels du maïs : *Metopolophium dirrho-*  
*dum* et *Sitobion avenae* (Brizay-37-, La  
Bazoche Gouët-28-, Charsonville, Vienne  
en Val, Amilly, Courtemaux, -45-);

- *Rhopalosiphum padi*, à surveiller actuel-  
lement, est encore peu présent, sauf cas  
exceptionnels (48% des panicules coloni-  
sées à Férolles-45-, sur maïs doux).

Les auxiliaires sont nombreux et très  
actifs.

**Surveiller l'éventuelle colonisation des  
panicules par *R. padi*, particulièrement  
dans les parcelles où un traitement**

**contre la pyrale a été réalisé avec des  
pyréthrinoides (traitements en pulvéri-  
sation) ; en effet, ce type de traitement  
a un effet négatif sur la faune auxiliaire.**

**Seuil d'intervention : une panicule sur  
2 colonisée.**

### Cicadelles

Fréquentes dans quelques parcelles (Char-  
nizay-37-).

## Tournesol

**Stade** : pleine floraison

## Maladies

Dans la plupart des parcelles, pas de  
développement important de maladies ;  
des cas de mildiou (Ardentes-36-).

## Betterave

## Maladies

**Oïdium** : observé sur variété sensible  
(Angelina) dans plusieurs secteurs de la  
région (source ITB) ; toutes premières  
étoiles observées sur «Baccara» (Briare/  
Essonne-45-);

**Rouille** : quelques pustules (Germignon-  
ville-28-);

**Ramulariose** : présente dans de nom-  
breuses parcelles (8 à 40% des plantes  
atteintes, 1 à 2 taches par plante atteinte).

**Jaunisse** : symptômes observés dans  
quelques parcelles (Echilleuse-45-).

**La date de la première intervention  
fongicide dépend de l'apparition des  
premiers symptômes de maladie (le  
plus souvent, l'oïdium), fonction :**

- du climat,
- de la sensibilité variétale,
- de l'irrigation.

**Surveillez l'apparition des symptômes  
dans vos parcelles.**

## Pour info

**Colza** : recherchez la présence de larves  
de **baris** au niveau des pieds.

**Description de la larve** : 4 à 7 mm, arquée,  
couleur jaunâtre, tête marron.

## Maïs

Pucerons : peu  
présents

## Betterave

Oïdium :  
premières étoiles

### Captures de Pyrale du maïs sur pièges à phéromones

Dépt	Lieu	début vol	cumul hebdo	total
18	<b>Pays Fort et Sancerrois</b>			
	Aubigny/Nere	4/6	-	22
	Aubigny/Nere2	12/6 (x)	4	37
18	<b>Champagne Berrichonne</b>			
	Avord	13/6	11	28
	Ste Solange	5/6	12	56
	Civray	21/6	-	5
	Le Subdray	5/6	0	9
	Vornay	30/5	0	35
18	<b>Sologne</b>			
	Argent/Sauldre	12/6 (x)	4	65
	Presly	12/06 (x)	2	96
18	<b>Vallée de Germigny</b>			
	Blet	5/6	0	32
28	<b>Drouais Thimerais</b>			
	Crécy-Couvé	26/6	20	42
28	<b>Beauce Dunoise</b>			
	Fontenay/Conie	5/6	63	108
	Germignonville	20/6	-	37
	Moléans	21/6	3	17
28	<b>Beauce</b>			
	Ecublé	24/6	-	20
28	<b>Perche</b>			
	La Bazoche Gouët		0	0
37	<b>Richelais</b>			
	Anché	14/6	6	107
	Brizay (Croisnes)	14/6	1	47
	Champigny/Veude	29/5	15	47
	Tavant	14/6	2	87
37	<b>Gâtine de Loches et de Montrésor</b>			
	Chambourg	31/5	-	6
	Charnizay	14/6	24	37
37	<b>Val de Loire</b>			
	Nazelle Négron*	3/6	13	32
37	<b>Région de Ste Maure</b>			
	Vou	28/6(x)	-	30
37	<b>Bassin de Savigné</b>			
	St Laurent de Lin	7/6	4	62

Dépt	Lieu	début vol	cumul hebdo	total
36	<b>Champagne Berrichonne</b>			
	St Maur	21/6	1	20
	Vatan	4/6	0	13
36	<b>Boischaut Nord</b>			
	Le Blanc	10/6	8	58
36	<b>Brenne</b>			
	Martizay	7/6	-	39
41	<b>Vallée et Côteaux de la Loire</b>			
	Montlivault*	3/6	-	24
41	<b>Beauce</b>			
	Averdon*	21/6	12	22
	Mulsans*	18/6	12	30
	Séris*	24/6	42	51
	Suèvres*	18/6	-	18
	Villerville	14/6	7	36
41	<b>Gâtine Tourangelle</b>			
	Ambloy*	25/6	0	34
41	<b>Grande Sologne</b>			
	Nouan/Loire*	14/6	-	17
41	<b>Sologne Viticole</b>			
	Soings*	3/6	0	32
45	<b>Beauce</b>			
	Guigneville	7/6	-	20
45	<b>Beauce de Patay</b>			
	Baccon	18/6	-	49
	Charsonville	25/6	-	49
	Villamblain	21/6	45	68
45	<b>Val de Loire</b>			
	Férolles *	21/6	0	8
	Jargeau	8/6	20	67
	Tavers	25/06(x)	1	31
45	<b>Gâtinais Est</b>			
	Amilly	13/6	6	44
	Courtemaux	1/6	20	70
45	<b>Puisaye</b>			
	Ouzouer/Trézée	5/6	1	72

\* : parcelles en maïs doux

- : pas de données récentes

28/6(x) : pose tardive du piège, début de vol probablement plus précoce